



LES REPORTERS EN SERBE




L'Effraie des clochers (*TYTO ALBA*)

Masque facial blanc en forme de coeur

Ses ailes sont longues et plutôt étroites

Poitrail est blanchâtre à blanc roussâtre plus ou moins piqueté de brun foncé



Photographie de Steevie B.

Classification :

<u>Règne</u>	<i>Animalia</i>
<u>Embranchement</u>	<i>Chordata</i>
<u>Classe</u>	<i>Aves</i>
<u>Ordre</u>	<i>Strigiformes</i>
<u>Famille</u>	<i>Tytonidae</i>
<u>Sous-famille</u>	<i>Tytoninae</i>
<u>Genre</u>	<i>Tyto</i>

Description :

La chouette effraie mesure de 34 à 39 cm. Son visage a une forme de coeur. Sa poitrine est blanche, voire brunâtre, tandis que le dessus de son corps est gris. Elle possède de longues pattes munies de doigts puissants aux serres bien développées. Ses ailes sont longues et plutôt étroites. Elle a une envergure de 0,90 à 0,95 cm et pèse environ 415 g.

Symbole et légende :

L'Effraie était considérée comme la messagère du malheur avec son masque facial blanc et apparaissait la nuit comme un fantôme. D'un autre côté, elle symbolisait également le savoir et la sagesse. Aussi nommée la *dame blanche*, elle était encore épinglée vivante sur les portes au début du XX^e siècle, et ce afin de conjurer le mauvais sort.

Menacée ou non ?

De nombreuses menaces pèsent sur l'Effraie des clochers : modification du milieu de vie, trafic routier, pesticides, prédation. Ses principaux prédateurs sont la fouine (surtout pour les oeufs et les jeunes), l'hermine, le chat et le renard.

Nourritures et chasse :

La chouette effraie chasse la nuit. En effet, grâce à la forme de ses yeux, elle peut voir la nuit et détecte ses proies essentiellement grâce à son ouïe. Elle se nourrit essentiellement de petits rongeurs et de musaraignes et plus rarement de belettes ou de lapins, ainsi que de petits oiseaux, de chauves-souris, d'amphibiens ou enfin de gros insectes.

C'est par l'analyse des pelotes de réjection que l'ornithologue, Uttendoerfer, a pu connaître le régime alimentaire de l'Effraie.

Pelotes de réjection : également appelée boulettes de régurgitation, ce sont des boulettes rejetées par les oiseaux et qui contiennent les éléments durs et non digérés des proies qu'ils ont mangées (poils, os...)

Maman pond, papa chasse...

La femelle pond des œufs à même le sol, en général 5 à 8, parfois jusqu'à 15. Puis elle les couve durant 30 à 32 jours. Pendant qu'elle est occupée à les couvrir, c'est le futur papa qui chasse pour nourrir la future maman. Les jeunes sont ensuite nourris par les deux parents et quittent le nid familial après 55 jours.



Enquête réalisée par
Josselin CONAN

Photographie d'Adam Lucke.